

GASTROSKOPIA

Vatsalaukun tähystys eli gastroskopia tehdään ruokatorven, vatsalaukun ja pohjukkaissuolen sairauden toiminnallisten häiriöiden toteamiseksi. Tähystyksen yhteydessä voidaan tehdä pieniä toimenpiteitä.

Tähystykseen valmistautuminen

Tähystystä ennen tulee olla syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 8 tuntia. Aamulääkkeet otetaan vasta tutkimuksen jälkeen, poikkeustapauksista voi neuvotella lääkärin kanssa.

Rauhoittava esilääkitys

Lääkäri voi tarvittaessa aloittaa rauhoittavan lääkityksen tähystyksen yhteydessä. Esilääkityksen vuoksi asiakasta seurataan noin puoli tuntia toimenpiteen jälkeen. Mikäli rauhoittavaa lääkitystä käytetään, tulee asiakkaan mukana olla saattaja. Esilääkityksellä tehtävä tutkimus on varattava vastaanotosta ja se veloitetaan erikseen.

Tähystyksen kulku

Tähystin viedään suun kautta vatsalaukkuun. Jos sinun on vaikea niellä tähystintä, nielua voidaan tarvittaessa puuduttaa suihkeella. Hengitystiet pysyvät koko tähystyksen ajan avoimina. Tähystys voi aiheuttaa täyteläisyyden tunnetta, muttei varsinaista kipua. Tutkimuspöydällä maataan vasemmalla kyljellä. Tähystys kestää noin 20 minuuttia.

Tähystyksen jälkeen

Saat syödä ja juoda normaalisti, mutta vältä kuumaa ja karkeaa ruokaa 6 tunnin ajan. Jos nielu on puudutettu, pitää odottaa, kunnes puudutus lakkaa vaikuttamasta, jotta ruoka ja juoma ei menisi hengitysteihin. Puudutuksen vaikutus kestää noin tunnin.

Lääkkeet saa ottaa normaalisti. Jos tähystyksessä on tehty toimenpiteitä, tulee tähystyspäivänä välttää mahaa ärsyttävien särkylääkkeiden käyttöä verenvuotoriskin vuoksi. Tähystys ei yleensä edellytä sairauslomaa.

Tarvittaessa ota yhteyttä Lääkärikeskus Minervaan

RAUMA, p. 02 838 0800

EURA, p. 02 838 0880

PORI, p. 02 480 90090