

# HELICOBACTER PYLORI, ANTIGEENI

## F-HepyAg

### Tutkimuksen tarkoitus

Mahalaukun Helicobacter pylori -infektion osoittaminen sekä häättöhoidon onnistumisen arviointi aikaisintaan neljä (4) viikkoa hoidon päättymisestä.

### Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta

- Suolahapon erityksen estäjät: Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac.
- Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet: Primperan, Prepulsid, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma.
- Antasidit: Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Rennie
- Limakalvon suoja-aineet: Antepsin.

### Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta

- Kuuriluonteiset antibioottihoidot Protonipumpun estäjät: Esomeprazol, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol, Pantoprazol, Panzor, Pariet, Somac, Zolt.

### Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta

- Helikobakteerin häättöhoidot: Helipak A, Helipak K.

### Näytteenotto

- Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin.
- Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen. Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi.
- Laittakaa ulostetta noin yhden teelusikallisen verran laboratorion saamaanne kuivaan näytepurkkiin purkin kannessa olevan lusikan avulla ja sulkekaa korkki huolellisesti. Huolehtikaa, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.
- Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Kiinnittäkää tarra näyteputken kylkeen. Näytepurkki pakataan tiiviisti suljettavaan muovipussiin.

### Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näyte laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen.

Mikäli otatte näytteen illalla, säilyy se seuraavaan päivään jääkaappilämpötilassa.

