

KIHOMATONÄYTE

F-Enve-O

Tutkimuksen tarkoitus

Kihomatoinfektion toteaminen, kun sitä epäillään peräaukon kutinan tai epidemiologisten syiden perusteella.

Näytteenotto

- Näyte otetaan heti aamulla heräämisen jälkeen ennen ulostamista ja peseytymistä. Vanutikku kostutetaan vesijohtovedellä. Kostutetulla vanutikulla hangataan voimakkaasti peräaukon suuta ja poimuja.
- Hankaamisen jälkeen vanutikku työnnetään hetkeksi peräaukkoon noin 0,5 cm syvyyteen. Tikku laitetaan näyteputkeen, jonka pohjalla on 1-2 ml vesijohtovettä. Tikku katkaistaan niin lyhyeksi, että korkin saa kunnolla kiinni.
- Tarraan tulee kirjoittaa nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra näyteputken kylkeen. Laittakaa näyteputki muovipussiin ja sulkekaa pussi hyvin.

Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näyteputki laboratorioon samana päivänä kun se on otettu. Jos näytettä joutuu säilyttämään kotona, säilytetään se jääkaapissa.