

## HELICOBACTER PYLORI, antigeeni

### F-HepyAg

#### Tutkimuksen tarkoitus

Mahalaukun Helicobacter pylori -infektion osoittaminen sekä häättöhoiton onnistumisen arviointi aikaisintaan neljä (4) viikkoa hoidon päättymisestä.

#### **Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta**

Suolahapon erityksen estäjät: Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac.

Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet: Primperan, Prepulsid, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma.

Antasidit: Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Rennie

Limakalvon suoja-aineet: Antepsin.

#### **Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta**

Kuuriluonteiset antibioottihoidot

Protonipumpun estäjät: Esomeprazol, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol, Pantoprazol, Panzor, Pariet, Somac, Zolt.

#### **Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta**

Helikobakteerin häättöhoitot: Helipak A, Helipak K.

#### Näytteenotto

Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen. Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi.

Laittakaa ulostetta noin yhden teelusikallisen verran laboratorion saamaanne kuivaan näytepurkkiin purkin kannessa olevan lusikan avulla ja sulkekaa korkki huolellisesti.

Huolehtikaa, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.

Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra näyteputken kylkeen.

Näytepurkki pakataan tiiviisti suljettavaan muovipussiin.

#### Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näyte laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Mikäli otatte näytteen illalla, säilytys se seuraavaan päivään jääkaappilämpötilassa.