

ULOSTEEN VERI

F-hHb-O

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on ruuansulatuskanavassa tapahtuvan verenvuodon osoittaminen.

Tutkimukseen valmistautuminen

Koska suolistoperäinen vuoto voi olla ajoittaista, suositellaan kolmea peräkkäistä näytettä. Tutkimus ei vaadi erityisruokavaliota. Näytettä ei voi kuitenkaan ottaa kuukautisten aikana.

Näytteenotto

Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin.

Mikäli uloste on löysää (ripuliuloste) tai näytteessä on näkyvää verta, ei näyte ole kelvollinen.

Odottakaa tällöin seuraavaa kiinteää ulostetta ja ottakaa näyte siitä.

Laittakaa ulostetta noin yhden teelusikallisen verran laboratorion saamaanne kuivaan näytepurkkiin purkin kannessa olevan lusikan avulla. Sulkekaa korkki huolellisesti.

Huolehtikaa, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.

Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra näyteputken kylkeen.

Laittakaa näytepurkki muovipussiin ja sulkekaa pussi hyvin.

Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näytepurkki laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.